

Problem - Pflanzen

=> einfach erkennen
=> richtig bekämpfen
=> sicher entsorgen

Problempflanzen sind invasive Neophyten oder einheimische Pflanzen, die sich stark ausbreiten und/oder für Mensch und Tiere schädlich sind.



Infoblatt
Neophytensack



Invasive Neophyten

Als Neophyten werden gebietsfremde Pflanzen bezeichnet, die nach 1492 (Entdeckung Amerika) bewusst als Nutz- oder Gartenpflanzen oder ahnungslos durch Einschleppung zu uns gelangten.

Die meisten Neophyten haben sich gut in unsere Pflanzenwelt eingegliedert und bereichern die Artenvielfalt. **Ein kleiner Teil** der Neophyten sind aber **invasive Arten**, die sich schnell über Samen, Wurzel oder Sprosssteile ausbreiten und dem hiesigen Ökosystem schaden.

Welche Probleme machen diese Pflanzen

- Sie können:
- die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden
 - einheimische Pflanzen- und Tierarten verdrängen
 - zu Schäden an Bauwerken mit hohen Kosten führen
 - nach einer unkontrollierten Verbreitung zu immensen Kosten für deren Beseitigung führen

Wie wirkungsvoll bekämpfen

1. Frühzeitig die Pflanzen vor dem Absamen entfernen
2. Regelmässig verseuchte Bestände jäten
3. Pflanzen, die nicht ausgegraben werden können, immer wieder schwächen, indem man ihnen die Blätter und Triebe entfernt oder sie ringelt (siehe letzte Seite).
4. Pflanzen immer in der Kehrichtabfuhr entsorgen (nicht im Kompost)

Kanadische Goldrute / Riesen Goldrute

Solidago canadensis / Soldigao gigantea

Herkunft	Nordamerika
Höhe/Grösse	50 bis 250 cm
Blüte	Juli bis Oktober
Ausbreitung	rund 19'000 Flugsamen pro Stängel und unterirdische Ausläufer
Vorkommen	Gärten, Brachland, Strassen-, Bahn- und Uferböschungen, extensive genutzte Wiesen und Weiden
Gefahr	Breitet sich schnell aus, verdrängt einheimische Arten



Bekämpfung

Pflanzen vor dem Verblühen ausgraben und im Kehricht entsorgen



Riesen-Bärenklau

Heracleum montegazzianum

Herkunft	Kaukasus
Höhe/Grösse	bis 3 Meter hoch
Blüte	Juli bis September
Ausbreitung	mehr als 10'000 Samen pro Pflanzen, die 7 Jahre keimfähig sind
Vorkommen	Gärten, an feuchten, nährstoffreichen Standorten an Ufer und Waldrändern
Gefahr	Hautverbrennungen nach Berührung und Kontakt mit Sonnenlicht. Bildet gross Bestände und verdrängt einheimische Pflanzen



Bekämpfung

Blüte vor dem Verblühen abschneiden, Pflanze ausgraben und im Kehricht entsorgen

Hautkontakt vermeiden!!

Drüsiges Springkraut

Impatiens glandulifera

Herkunft	Himalaja
Höhe/Grösse	50 bis 250 cm
Blüte	Juli bis September
Ausbreitung	Eine Pflanze produziert bis ca. 4000 Samen, die bis 7m weit weggeschleudert werden
Vorkommen	Nährstoffreichen feuchten Standorten an Ufern, in Wäldern und in Gärten
Gefahr	Breitet sich schnell aus und verdrängt einheimische Arten, kann an Gewässern zu Erosion führen.



Bekämpfung

Pflanzen vor dem blühen ausreissen und im Kehricht entsorgen


Während mehreren Jahren Bekämpfung wiederholen



Japanischer- Knöterich

Reynoutria japonica

Herkunft	Asien
Höhe/Grösse	bis 3 Meter hoch
Blüte	August bis September
Ausbreitung	Über Wurzeln und Rhizome. Ein Rhizomstück von 1 cm genügt, für eine neue Pflanze!
Vorkommen	In Gärten, an Ufern, in Wäldern, auf Deponien, eigentlich überall
Gefahr	Bildet grosse Bestände und verdrängt einheimische Pflanzen. Kann Teerbefälle durchbrechen und Uferböschungen destabilisieren



Bekämpfung

Kompletter Aushub der Pflanzen inkl. Wurzeln, danach Kontrolle während mehreren Jahren



Einjähriges Berufkraut

Erigeron annuus

Herkunft	Nordamerika
Höhe/Grösse	30 bis 150 cm
Blüte	Juli bis Oktober
Ausbreitung	Bis zu 50'000 Samen pro Pflanze, die vom Winde verweht werden
Vorkommen	Gärten, Brachland, Wegränder, Strassen- und Bahnböschungen, Äcker, Wiesen und Weiden
Gefahr	Breitet sich schnell aus, bildet grosse Bestände und verdrängt einheimische Pflanzen auf Öko-Flächen
Bekämpfung	Pflanzen vor der Samenbildung jäten. Wiederholung über mehrere Jahre notwendig. Pflanze im Kehricht entsorgen



Robinie / falsche Akazie

Robinia pseudoacacia * siehe letzte Seite

Herkunft	Nordamerika
Höhe/Grösse	Baum bis 30 Meter hoch
Blüte	Mai bis Juni
Ausbreitung	Hülsenfrüchte, die vom Winde bis 100m weit verfrachte werden und 10 Jahre keimen. Wurzelausläge
Vorkommen	Gärten, Magerwiesen, Waldränder, Wegränder, Ödland, felsige Hänge, Waldlichtungen
Gefahr	Verdrängt heimische Arten durch dichte Bestände (macht Ausläufer). Samen, Blätter und Rinde sind giftig



Bekämpfung

Jungpflanzen jäten. **Bäume Ringeln***. Dauernd nachroden und jäten. Holz verbrennen, Samen und Blätter in Kehricht entsorgen



Sommerflieder
Buddleja davidii

Table with 2 columns: Attribute, Value. Rows: Herkunft (Asien), Höhe/Grösse (2 bis 4 Meter hoch), Blüte (Juli bis August), Ausbreitung (Ein Strauch bildet ca. 3'000'000 Samen pro Jahr...), Vorkommen (Gärten, warme, trockene Standorte...), Gefahr (Dichte Bestände verdrängen einheimische Pflanzen...)



Bekämpfung
Vor dem Verblühen Pflanzen ausgraben und im Kehricht entsorgen

Essigbaum
Rhus typhina

Table with 2 columns: Attribute, Value. Rows: Herkunft (Nordamerika), Höhe/Grösse (5 bis 8 Meter hoch), Blüte (Mai bis Juni), Ausbreitung (Starke Ausbreitung über Wurzel-ausläufer), Vorkommen (Gärten, Waldrändern, Deponien und Schuttablagerungen), Gefahr (Verdrängt einheimische Pflanzen und Wurzel-ausläufer können Bauwerke beschädigen...)



Bekämpfung
Jungpflanzen jäten. Bäume Ringeln*. Kontinuierlich nachjäten. Holz verbrennen, Grünteile in Kehricht entsorgen.

Götterbaum
Ailanthus altissima

Table with 2 columns: Attribute, Value. Rows: Herkunft (China und Nordkorea), Höhe/Grösse (Baum bis 30 Meter), Blüte (Juni bis Juli), Ausbreitung (Starke Ausbreitung über Flugsamen...), Vorkommen (Restflächen, trockene Standorte auf Stassen...), Gefahr (Kann gross Bestände bilden und einheimische Pflanzen verdrängen...)



Bekämpfung
Jungpflanzen jäten. Bäume Ringeln*. Kontinuierlich nachjäten. Holz verbrennen, Grünteile und Samen in Kehricht entsorgen.

Kirschlorbeer
Prunus laurocerasus

Table with 2 columns: Attribute, Value. Rows: Herkunft (Westasien), Höhe/Grösse (bis 6 Meter hoch), Blüte (April bis Mai), Ausbreitung (Strauch produziert viele Früchte...), Vorkommen (Gärten, Parkanlagen, Wälder, Hecken), Gefahr (Schnelle Ausbreitung durch Vogelkot...), Bekämpfung (Jungpflanzen jäten, grössere Pflanzen ausgraben...)



Schmalblättriges-Greiskraut
Senecio inaequidens

Table with 2 columns: Attribute, Value. Rows: Herkunft (Südafrika), Höhe/Grösse (40 bis 60 cm), Blüte (Mai bis Oktober), Ausbreitung (Bis zu 30'000 Flugsamen pro Pflanzen...), Vorkommen (Auf Restflächen und trockene Standorte an Stassen...), Gefahr (Verdrängt einheimische Pflanzen. Ist giftig für Rinder...)



Bekämpfung
Pflanzen mit Wurzeln vor dem Verblühen ausreissen und im Kehricht entsorgen. Nachjäten erforderlich

Jakobs Kreuzkraut
Senecio jacobea

Table with 2 columns: Attribute, Value. Rows: Herkunft (Europa und Westasien), Höhe/Grösse (30 bis 100 cm), Blüte (Juni bis August), Ausbreitung (Pro Pflanzen tausende Flugsamen...), Vorkommen (Gärten, Wiesen, Weiden, Restflächen an Stassen...), Gefahr (Pflanze breitet sich aus. Sie ist giftig für Rinder...), Bekämpfung (Pflanzen vor dem Verblühen ausreissen und im Kehricht entsorgen)



Neophytensack

Der spezielle Sack dient der fachgerechten und kostenlosen Entsorgung der Problempflanzen.

Der Neophytensack kann bei sämtlichen teilnehmenden Gemeinden bei den zuständigen Stellen bezogen werden.

In der Gemeinde 2543 Lengnau BE können die Säcke bei der Präsidialabteilung der Einwohnergemeinde Lengnau, Dorfplatz 1, 2543 Lengnau BE (Gemeindehaus 1. Stock) oder beim Werkhof der Einwohnergemeinde Lengnau BE, Rolliweg 3, 2543 Lengnau BE bezogen werden.

Bei Fragen können Sie sich an die untenstehenden zuständigen Fachpersonen der Einwohnergemeinde Lengnau BE wenden:

Herr Fritz Alchenberger, Friedhofgärtner, Werkhof der Einwohnergemeinde Lengnau BE, Natel 079 437 47 62

oder

Herr Steve Schranz, Geschäftsleiter-Stv., Präsidialabteilung der Einwohnergemeinde Lengnau BE, Tel. 032 654 71 01 oder Mail info@lengnau.ch

Ringeln bei Robinien, Essigbaum, Götterbaum

Ringeln = Entrindung auf 80-90% des Stammumfangs (verhindert das Neuaustreiben) und auf 15 cm Breite auf ca. 1 bis 1.5m Stammhöhe im Februar. Der wenige Saft, der noch zirkuliert, ernährt den Baum, er kann aber keine Reserven mehr anlegen.

Im Folgejahr, nach dem Erscheinen von Blättern und Blüten im Juni, Ringeln auf dem gesamten Stammumfang.

Es ist empfehlenswert, alle Robinien einer Population zu ringeln (auch die Stämme Ø < 10 cm).

Geringelte Bäume und dadurch abgestorbene Bäume im folgenden Februar fallen.



Autor:
Büro Kappeler
Dunantstr. 4
3006Bern
Planung und Beratung
031 371 80 91

Bilder ringeln: Monika Dirk
Bilder Robinie, Essigbaum: Erwin Jörg
Andere Bilder: Rolf Scheidegger, Samuel Kappeler